



FOSBAC[®] F200

LA DOSIS EFECTIVA



- **No se metaboliza**
- Rapidez de concentración activa sistémica
- Amplio espectro, eficaz contra Gram + y Gram -
- Bajo peso molecular
- No se liga a proteínas plasmáticas
- No afecta el desempeño de los animales
- Amplia distribución en el organismo



BENEFICIOS

La vía inyectable y su bajo peso molecular permiten alcanzar con rapidez concentraciones activas en los tejidos target.



TRATAMIENTO

Salmonella spp.

Escherichia coli

Pseudomonas

Pasteurella

Klebsiella

Proteus

Staphylococcus spp.

Streptococcus spp.

Clostridium


Corynebacterium

Erysipelothrix rhusiopathiae

Haemophilus



PERIODO DE RETIRO 7 DÍAS



DOSIS

1 cm³ cada 10 Kg de peso vivo (equivalente a 15 mg/Kg de peso vivo), cada 24 horas.

En lechones, 0,3 cm³ hasta los 7 días de vida.

* Dosis de acuerdo al criterio del médico veterinario actuante.



PRESENTACIÓN

Frasco ampolla de polvo estéril de 20 g + frasco de diluyente estéril de 100 ml.

Los antibióticos son una valiosa herramienta frente a la presentación de determinadas patologías, de nosotros depende su "Uso racional y responsable".



@bedsonlatam



@bedsonlatam



+54 911 2296 7994

info@bedson.com