ANTIBIÓTICO

FOSBAC® PLUS T

TODA LA EFICACIA DE FOSBAC + TILOSINA

- **No se metaboliza**
- Bajo peso molecular
- Amplio espectro, eficaz contra Gram +, Gram - y Mycoplasmas
- No afecta el desempeño de los animales
- Amplia distribución en el organismo
- No se liga a proteínas plasmáticas
- Gran difusión en tejidos con pobre vascularización:

Médula ósea | Abscesos | Linfa y bilis | Barrera hemato-encefálica | Articulaciones

- Eliminación renal **98% en las primeras 24 horas**

MECANISMO DE ACCIÓN

- Penetra en el microorganismo utilizando el sistema de transporte del alfa glicerofosfato.
- Produce una inhibición enzimática (Piruviltransferasa) por lo cual interfiere el primer paso de la síntesis de la pared celular.

UNA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Que asegura "RESULTADOS CLÍNICOS SATISFACTORIOS"

FOSBAC® PLUS T sigue demostrando su alta eficacia frente a las enfermedades bacterianas primarias y secundarias.

FOSBAC® PLUS T cuenta con:

- Actividad antimicrobiana comprobada
- Farmacocinética estudiada
- Solubilidad y estabilidad adecuada

La correcta elección frente a enfermedades:

RESPIRATORIAS · DIGESTIVAS · SISTÉMICAS

TRATAMIENTO SUGERIDO

- Salmonella spp.
- Escherichia coli
- Avibacterium paragallinarum
- Staphylococcus spp.
- Corinebacterium
- Mycoplasmas
- Estreptococcus
- Estafilococcus
- Brucella Suis
- Clamidias

DOSIFICACIÓN SUGERIDA

TRATAMIENTO RECOMENDADO 7 DÍAS

	PREMIX (*1) (*3) Kg Fosbac / 1 Tn Alimento	SOLUBLE (*1) (*2) (*3) g Fosbac / 1 L Agua
PARRILLERO Pre iniciador - Iniciador - Terminador	2,5	1
POSTURA COMERCIAL Recría	2	1
REPRODUCTORAS Recría	3,5	1
Producción	4,5	2

(*1) Resiste el pelletizado (105°C durante 60 segundos a una humedad relativa del 100%). (*2) Producto estable disuelto en el agua de bebida durante 24 hs
(*3) De acuerdo al criterio del veterinario actuante

PERÍODO DE RETIRO (en días)
Tiempo de Retiro (MRL 0,5 microgramo/ml)

	Músculo	Hígado	Riñón
ORAL	1,12	1,27	2,55
INYECTABLE	1,72	0,42	0,92

PERÍODO DE RETIRO EN HUEVOS (en días)
Tiempo de Retiro (MRL 0,5 microgramo/ml)

	Clara	Yema
ORAL	0,46	4,02
INYECTABLE	1,37	4,6

Fuente: Determination and Withdrawal Time of Fosfomycin in Chicken Muscle, Liver and Kidney (International Journal of Poultry Science 10 (8): 644-655, 2011ISSN 1682-8356 © Asian Network for Scientific Information, 2011)

Pese a que en aves después de menos de 3 días no hay residuos en riñón, desde BEDSON S.A. seguimos manteniendo el periodo de carencia en 7 días, dando así mayor seguridad en la inocuidad del producto alimenticio.

DOSIS 160 mg/Kg DE PESO VIVO

* Dosis de acuerdo al criterio del médico veterinario actuante.

PRESENTACIONES

PREMIX 1 Kg - 5 Kg - 20 Kg

SOLUBLE 160 g - 500 g - 800 g - 1 Kg - 5 Kg - 20 Kg

Los antibióticos son una valiosa herramienta frente a la presentación de determinadas patologías, de nosotros depende su **"Uso racional y responsable"**.

@bedsonlatam · @bedsonlatam · +54 911 2296 7994 · info@bedson.com