



FOSBAC[®] F200

LA DOSIS EFECTIVA



- **No se metaboliza en el hígado**
- Rapidez de concentración activa sistémica
- Amplio espectro, eficaz contra Gram + y Gram -
- Bajo peso molecular
- No se liga a proteínas plasmáticas
- No afecta el desempeño de los animales
- Amplia distribución en el organismo



BENEFICIOS

La fosfomicina de uso inyectable que permite alcanzar con rapidez concentraciones activas en los tejidos target.

La correcta elección frente a enfermedades:



RESPIRATORIAS



DIGESTIVAS



GENITOURINARIAS



SISTÉMICAS



TRATAMIENTO

Salmonella spp.


Actinobacillus pleuropneumoniae

Pasteurella spp.

Escherichia coli



PERIODO DE RETIRO 7 DÍAS



*Soraci et. al 2010



DOSIS

1 cm³ cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 15 mg/kg de peso vivo), cada 24 horas.

En lechones, 0,3 cm³ hasta los 7 días de vida.

* Dosis de acuerdo al criterio del médico veterinario actuante.



PRESENTACIÓN

Frasco ampolla de polvo estéril de 20 g + frasco de diluyente estéril de 100 ml.

Los antibióticos son una valiosa herramienta frente a la presentación de determinadas patologías, de nosotros depende su “Uso racional y responsable”.



@bedsonlab



@bedsonlatam



+54 911 2296 7994

info@bedson.com